SUCRAM® - ЛУЧШАЯ КОМБИНАЦИЯ ПОДСЛАСТИТЕЛЕЙ ДЛЯ МАСКИРОВКИ ГОРЬКОГО ВКУСА САХАРИНА

Катерина ИОНЕСКУ - Эксперт по продукту

Конкурент из Китая в настоящее время продвигает продукт, который, как он утверждает, содержит молекулы, которые могут уничтожить конкретные группы, придающие горький вкус сахарину и позволит обеспечить более высокую дозу включения сахарина в рацион. Целью данного отчета является суммирование современных знаний о сладком и горьком вкусе сахарина, а также о возможностях маскировки горького вкуса, чтобы понять, может ли существовать этот вид продукта и может ли он конкурировать с продуктом SUCRAM® в качестве подсластителя, не обладающего горьким вкусом.

СЛАДКИЙ И ГОРЬКИЙ ВКУС САХАРИНА

С 19551 года хорошо известно из литературы, что интенсивный подсластитель сахарин имеет горький вкус, и что это не связано с производственными примесями, а связано с одной - единственной молекулой. Интенсивность горького и сладкого вкуса зависит от дозы сахарина (см. рисунок).

Максимальная интенсивность сладкого достигается при концентрации в диапазоне от 6,25 до 25 мМ и уменьшается в дальнейшем. Результаты показывают, что высокий уровень сахарина может быть даже вредным для сладкого восприятия вкуса и предполагают, что высокие дозы сахарина подавляют его. Горькая интенсивность постоянно увеличивается и становится выше, чем сладкий вкус, когда доза сахарина составляет более 25 мМ².

Тем не менее, известно, что сладкие и горькие соединения не активируют те же типы клеточных рецепторов. Сладкие компоненты являются агонистами рецептора вкуса (Taste), комбинированные рецепторы T1R2 (тип 1, член 2) и T1R3 (тип 1, член 3), в то время как горькие соединения активируют различные рецепторы вкуса из T2R (тип 2).

¹ Helgren, F.J., Lynch, M.J., Kirchmeyer F.J., 1955. A taste panel study of the saccharin "off-taste". J.Pharm. Sci. 44:353-355.

² Galindo-Cuspinera V., Winnig M., Bufe B., Meyerhof W., Breslin P.A.S., 2006. A TAS1R receptor-based explanation of sweet `water-taste`. Nature 441: 354-357.

ПАНКОСМА: НОВОСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИССЛЕДОВАНИЙ

На рисунке представлены 2 категории вкусовых рецепторов, активируемых сахарином (адаптировано³)

Вкус	Umami	Sweet	Bitter	Sodium	Sour and carbonation cells
РЕЦЕПТОР					
НАЗВАНИЕ РЕЦЕПТОРА	T1R1+T1R3	T1R2+T1R3	~30 T2Rs	ENaC	PKD2L1 CA IV
АГОНИСТ	L-glutamate L-amino acids glycine L-AP4 Nucleotide enhancers IMP, GMP, AMP	Sugars Sucrose, fructose, glucose Artificial sweeteners acesulfame K САХАРИН D-amino acids D-alanine, D-serine, D-phenylalanine Glycine Sweet proteins Monellin, thaumatin	Cycloheximide (mT2R5) Denatonium (mT2R8, hT2R4) Salicin (hT2R16) PTC (hT2R38) САХАРИН (hT2R43, hT2R44) Quinine strychnine atropine	Low NaCl Sodium salts	Acids Citric acid Tartaric acid HCl Carbonated drinks

Сахарин способен активировать рецептор сладкого вкуса T1R2+T1R3, а также 2 специфических рецептора горького вкуса: T2R43 и T2R44 у человека. Знания о связующем родстве сахарина с T1R2+T1R3 остаются скудными. Имеющиеся данные показывают, что сахарин связывается с аминотерминальным доменом (ATD) T1R2 рецептора.

³ Yarmolinsky D.A., Zuker C.S., Ryba N.J.R., 2009. Common sense about taste: from mammals to insects. *Cell*. 139(2): 234-244.

РANCOSМА: НОВОСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИССЛЕДОВАНИЙ

На рисунке приведено схематическое изображение сахараина в пределах T1R2-ATD, а оранжевым цветом выделены места связывания сахараина⁴.

СВЯЗЫВАНИЕ СО СЛАДКИМ ВКУСОМ РЕЦЕПТОР T1R2

Связь сахараина с рецепторами горького вкуса также ограничена, но некоторые авторы⁵ предполагают, что существует огромное сходство между химическими структурами ацесульфам-К и сахараина, что может быть одной из причин их горького вкуса (см. рисунок). Можно также заметить, что данное сходство химических функций частично соответствует связыванию сахараина в T2R рецептора. Как следствие, продукт, который «содержит» некоторые молекулы, способные инактивировать функциональную группу, придающую сахараину его горький вкус, также уничтожит и функциональную группу, создающую связи с рецептором сладкого вкуса и отменит его конечную сладкую интенсивность.

СХОДСТВА ХИМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ МЕЖДУ АЦЕСУЛЬФАМ-К И САХАРИНОМ

ВОЗМОЖНОСТИ МАСКИРОВКИ ГОРЬКОГО ВКУСА

Существуют две технологии маскировки горького вкуса. Первая основана на молекулярных механизмах рецептора горького вкуса, а вторая использует восприятие вкуса. Целью первой методики является выявление антагонистов к T2R рецепторам. У людей известны по меньшей мере 25 T2R, которые могут быть активированы более чем 100 различными горькими соединениями. До сих пор было идентифицировано и опубликовано только 5 антагонистов, и они были в основном эффективны на отдельных T2R6. Как следствие, поиск горького маскирующего агента с использованием антагониста к рецептору горького вкуса возможен, но это не очень легко. С учетом обусловленных затрат на разработку, необходимых для получения эффективного компонента, это не будет столь экономически эффективным для применения в кормах.

⁴ Masuda K, Koizumi A, Nakajima Ki, Tanaka T, Abe K, et al., 2012. Characterization of the Modes of Binding between Human Sweet Taste Receptor and Low-Molecular-Weight Sweet Compounds. *PLoS ONE* 7(4): e35380.

⁵ Horne J, Lawless H.T., Speirs W., Sposato D., 2002. Bitter taste of saccharin and acesulfame-K. *Chem. Senses*. 27: 31-38.

⁶ Pydi S.P., Sobotkiewicz T., Billakanti R., Bhullar R.P., Loewen M.C., Chelikani P., 2014. Bitter taste receptor (T2R) blockers. *The Journal of biological chemistry*. 289: 25054-25066.

ПАНСОМА: НОВОСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Еще один вариант маскировки горечи - усиление сладкого ощущения.

Это можно сделать, если использовать специфические ароматические препараты. Это часть ноу-хау PANCOSMA по разработке рецептур подсластителей. Как SUCRAM® 3D, так и SUCRAM® C-150 были разработаны с адекватными ароматическими смесями, которые способствуют интенсивности сладости и ограничивают горькое восприятие. Когда в состав SUCRAM® C-150 входит в основном неогесперидин дигидрохалькон7 (NHDC), в состав SUCRAM® 3D входят более интенсивные ароматические молекулы, такие как мальтол8 и ванилин9, которые, как известно, улучшают восприятие сладости. Формулы SUCRAM® позволяют маскировать восприятие области горечи, присутствующей как в сахарине, так и в корме, как это видно на рисунке.

SUCRAM® МАСКИРОВКА ГОРЕЧИ

Ноу-хау в области рецептур подсластителей и вкусовых комбинаций для обеспечения маскировки горького было объединено со специальной производственной технологией **Iso-Fusion Technology (IFT®)** для всего ассортимента SUCRAM®. Технология IFT® обеспечивает оптимальное диспергирование компонентов вкуса и подсластителя в пределах одной частицы, что позволяет добиться превосходного распределения и однородности в конечном виде. Продукция компании SUCRAM® обеспечивает животным достаточный уровень сахараина с наилучшей маскирующей горький вкус способностью ароматических соединений.

⁷ Sharma S., Lewis S., 2010. Taste masking technologies: a review. *International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences*. 2(3): 6-13.

⁸ Ziegler E., Ziegler H., 2008. *Flavourings: Production, Composition, Applications, Regulations*. John Wiley & Sons, p 320.

⁹ Andrew J. Taylor, Robert Linforth, 2009. *Food Flavour Technology* John Wiley & Sons- p 3.

PANCOSMA: НОВОСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ВЫВОДЫ

- Сахарин в высокой концентрации имеет горький вкус.
- Продукты инактивации функциональной группы T2R могут позволить устранить горький вкус сахарина, однако, вместе тем ликвидируют и сладкий вкус и сделают продукт неэффективным, как подсластитель. Нет существующего продукта, способного инактивировать исключительно горький вкус сахарина.
- Слишком высокие дозы сахарина способны подавлять сладкое восприятие и ограничить интерес животного к продукту.
- Составы компании SUCRAM® способны уменьшить горькое ощущение сахарина.
- В продукте SUCRAM® обеспечивается однородное распределение вещества за счет использования технологии IFT® и соответствующий уровень сахарина для интенсивного восприятия сладкого вкуса.